

A tutte le persone con epilessia sono garantiti alcuni diritti circa la spesa sanitaria e, a seconda del grado di invalidità, assistenza individuale, sicurezza domiciliare, protesi, integrazione scolastica, lavorativa e sociale.

... ESENZIONE TICKET....

L'esenzione parziale dal pagamento della spesa sanitaria per patologia è regolamentata dal DMS N. 329 del 28.5.99.

L'esenzione per Epilessia consente di ottenere:

- assistenza farmaceutica con possibilità di pluriprescrizione
- le visite specialistiche
- monitoraggio dei farmaci AED
- alcuni esami ematochimici
- EEG CON PRIVAZIONE DEL SONNO
- esami neuroradiologici (TAC e RM)

... INVALIDITÀ CIVILE ...

Per stabilire la percentuale di invalidità civile si fa riferimento al DMS n.43 del 5.2.1992 :

- tipo di epilessia
- tipo e frequenza delle crisi
- eventuale controllo farmacologico.

Le persone con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46% potranno accedere al lavoro tramite il collocamento mirato previsto dalla Legge n.68 del „99.

... PATENTE ...

La patente di guida di un conducente con epilessia deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione Medica locale finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia.

... SCUOLA ...

L'80% delle epilessie esordisce in età pediatrica.

Le crisi epilettiche non determinano di per sé disturbo alle funzioni cognitive. Nei casi in cui si associno problemi cognitivi, relazionali o altri handicap, si potrà avvalere di sostegni educativi o assistenziali. All'alunno con epilessia serve un buon clima di accettazione e conoscenza dei fenomeni che manifesta occasionalmente. In caso di crisi, il comportamento dell'insegnante e degli operatori scolastici è fondamentale sia per il bambino con la crisi che per i compagni.

C'è da fidarsi a portare il bambino con epilessia in gita? CERTAMENTE SÌ!

- Non togliete al bambino la miglior opportunità di integrazione;
- Il bambino va comunque tenuto sotto controllo;
- E' utile che i genitori forniscano adeguate informazioni a chi si occuperà del bambino durante la gita, soprattutto per quel che riguarda la somministrazione dei farmaci;
- Evitare le "privazioni di sonno";
- Evitare le insolazioni

Il bambino con epilessia può guardare la TV o lavorare al computer?

Solo in particolari tipi di epilessia la fotostimolazione può dare crisi (in questi casi sarà il medico specialista a consigliare degli occhiali speciali con lenti blu)

si consiglia comunque a tutti di :

- Mantenere illuminata la stanza in cui si trova lo schermo!
- Evitare di guardare la TV in fase di sonnolenza (con occhi semichiusi)
 - Adeguata distanza dallo schermo
- Schermo protetto e con scarso contrasto

CENTRO REGIONALE PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELL'EPILESSIA INFANTILE



MEDICI NPI

N.ZAMPONI
L.PORFIRI
M. SEVERINI
M.A.TAVONI
E.CESARONI
S.CAPPANERA
S. SILIQUINI

IP

C.VEROLI

TNFP

S.ANDREONI
C.CASELUNGHE
A.D'INCECCO
M.RADICIONI

NUMERI UTILI.....

- PER PRENOTAZIONI AMBULATORIALI CHIAMA IL 800.098.798
- PER PRENOTAZIONE O INFORMAZIONI SUI DH CHIAMA I TECNICI EEG AL 071-5962525 O L'INFERMIERA AL 071-5962465
- SE VUOI PARLARE CON IL REPARTO NPI CHIAMA LA COORDINATRICE SIG. RA F. REGNICOLI AL 071-5962421

ESAMI CHE POSSONO ESSERE PERIODICAMENTE RICHIESTI DAL MEDICO SPECIALISTA IN UN PAZIENTE CON EPILESSIA E IN TERAPIA CON FARMACI ANTIEPILETTICI

(i prelievi devono essere eseguiti a digiuno senza assunzione della terapia del mattino, che andrà somministrata dopo il prelievo):

- Esami di routine: EMOCROMO + FORMULA TRANSAMINASI (AST - ALT), GLICEMIA, FUNZIONALITA' RENALE, ELETTROLITI
- se il tuo bambino assume Depakin, in più deve fare: *DOSAGGIO ACIDO VALPROICO*
- Se il tuo bambino assume Tegretol, in più deve fare: *DOSAGGIO CARBAMAZEPINA*
- Se il tuo bambino assume Tolep, in più deve fare: *DOSAGGIO OXCARBAZEPINA*
- Se il tuo bambino assume Zarontin (Petinimid), in più deve fare: *DOSAGGIO ETOSUCCIMIDE*
- Se il tuo bambino assume il Kepra, in più deve fare: *DOSAGGIO LEVETIRACETAM*
- Se il tuo bambino assume il Topamax, in più deve fare: *DOSAGGIO TOPIRAMATO*
- Se il tuo bambino assume il Lamictal, in più deve fare: *DOSAGGIO LAMOTRIGINA*
- Se il tuo bambino assume il Gardenale / Luminale, in più deve fare: *DOSAGGIO FENOBARBITAL*

Altri esami (a discrezione del medico):

- EEG IN VEGLIA CON VIDEO (VIDEO EEG)
- EEG IN PRIVAZIONE DI SONNO

N.B.: Il giorno in cui deve fare l'esame ricordati di svegliare presto il tuo bambino/a perché deve dormire durante l'EEG!!!!

- VISITA NEUROPSICHIATRICA

▪ RMN /TAC ENCEFALO ISTRUZIONI PER UN CORRETTO USO DEI MICROCLISTERI

Rimuovere la capsula di chiusura ruotandola delicatamente 2-3 volte senza strappare.



Ungere il beccuccio

Mettere il paziente in posizione prona, con un cuscino sotto l'addome, o di lato. Un bambino piccolo può essere disteso sulle ginocchia.



Inserire il beccuccio nell'ano fino alla prima tacca nei bambini di età inferiore a 3 anni, per l'intera lunghezza in quelli di età superiore e negli adulti.



Durante la somministrazione tenere sempre il microclistere con il beccuccio inclinato verso il basso.

N.B. Non premere il microclistere prima di avere inserito il beccuccio nell'ano



Una volta inserito il beccuccio nell'ano vuotare il microclistere premendolo tra il pollice e l'indice. Estrarre il beccuccio tenendo sempre schiacciato il microclistere.



Tenere stretti i glutei per alcuni istanti per evitare la fuoriuscita della soluzione.



La presenza di un residuo di soluzione nel microclistere è normale; la dose somministrata è ugualmente corretta.

